



## موضوع:

روند مرگ و میر و سال های از دست رفته زندگی به دلیل آسیب های اجتماعی مانند خودکشی، قتل و اعتیاد، استان ایلام، ۱۳۸۸-۱۳۹۸



تهیه کننده:

زهرا جلیلیان

## روند مرگ و میر و سال های از دست رفته زندگی به دلیل آسیب های اجتماعی مانند خودکشی، قتل و اعتیاد، استان ایلام

زمینه و هدف: این مطالعه با هدف بررسی روند مرگ و میر و سال های از دست رفته زندگی (YLL) ناشی از آسیب های اجتماعی در استان ایلام انجام شد. روش بررسی: این مطالعه مقطعی از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸ در استان ایلام انجام شد. برای برآورد YLL، تمامی مرگ های ناشی از خودکشی، قتل و اعتیاد وارد مطالعه شدند. داده ها از سازمان پزشکی قانونی جمع آوری شده است. تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه ۲۳،۰) انجام شد. مقدار  $p < 0.05$  از نظر آماری معنی دار در نظر گرفته شد. یافته ها: بین سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹، ۱۷۱۲ مورد خودکشی، قتل و اعتیاد رخ داده است که در مجموع منجر به ۶۲۶۰۵ سال زندگی از دست رفته (۵۳۹۳۴ در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر) شده است. بیشترین فراوانی مربوط به گروه سنی ۲۹-۱۵ سال و کمترین آن مربوط به گروه سنی ۱۴-۰ سال بود ( $p < 0.001$ ). در طول دوره مورد مطالعه، مردان بیش از زنان در معرض خودکشی، قتل و اعتیاد در ایلام بودند ( $p < 0.001$ ). طی سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸، تعداد خودکشی ها و قتل ها در استان ایلام برای هر دو جنس روندی کاهشی را آغاز کرد، در حالی که تعداد مرگ و میرهای ناشی از اعتیاد رو به افزایش بود. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که گروه های سنی ۱۵ تا ۲۹ سال بیشترین میزان YLL ناشی از خودکشی، قتل و اعتیاد را برای هر دو جنس داشتند. علاوه بر این، یافته ها نشان داد که YLL برای خودکشی و قتل کاهش یافته، اما برای اعتیاد افزایش یافته است.

## روند مرگ و میر و سال های از دست رفته زندگی به دلیل آسیب های اجتماعی

۱. زهرا جلیلیان ۲. فتح الله محمدیان ۳. ساسان احمدی ۴. یوسف ویسانی\*  
۱ مرکز تحقیقات آسیب های روانی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران  
۲ گروه روانشناسی، مرکز تحقیقات آسیب های روانی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران  
۳ مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، سازمان پزشکی قانونی، تهران، ایران  
مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایران